

Некоторые женщины испытывают симптомы беременности в течение недели после зачатия. Для других женщин, симптомы могут развиваться в течение нескольких недель, а может и не быть их вообще. Ниже приведен список некоторых наиболее распространенных признаков беременности.

Кровотечения:

Кровотечение может быть одним из ранних симптомов беременности. В 6-12 дней после зачатия эмбрион прикрепляется к стенке матки. Некоторые женщины могут испытывать судороги в этот период.

Другие причины: изменения менструального цикла, вызваны противозачаточными таблетками, инфекции.

Задержка менструального цикла:

Задержки или пропуски менструального цикла являются наиболее распространенным симптомом беременности. Если вы забеременели, следующий менструальный период должен быть пропущен. У многих женщин могут быть кровотечения тогда, когда они беременны, но, как правило, кровотечения будут короче и легче, чем нормальный менструальный цикл.

Другие причины: излишний вес, нехватка в весе, усталость, гормональные проблемы, напряжение, стресс, окончание приема противозачаточных таблеток.

Опухшие, чувствительные груди:

Опухшие или чувствительные груди являются симптомом, который может проявиться уже на 1-2 недели после зачатия. Женщины могут заметить изменения в груди, она может стать более чувствительной на ощупь, болеть или немного опухнуть.

Другие причины: гормональный дисбаланс, противозачаточные таблетки, надвигающейся менструации синдром (ПМС).

Усталость:

Ощущение усталости является симптомом, который также может проявиться уже в течение первой недели после зачатия.

Другие причины: стресс, утомление, депрессия, простуда или грипп, или другими заболеваниями.

Утренняя тошнота:

Это хорошо известный симптом беременности. Часто появляются между 2-8 неделью после зачатия. Некоторые женщины могут чувствовать утреннюю тошноту в течении всей беременности.

Другие причины: пищевое отравление, стресс, другие расстройства желудка.

Боль в пояснице:

Боль в пояснице может быть симптомом, который проявляется в начале беременности, однако, как правило, спина болит в течении всего периода беременности.

Другие причины: менструация, стресс, физическое или психическое напряжение.

Головные боли:

Резкое увеличение гормонов в организме может привести к головной боли в начале беременности.

Другие причины: обезвоживание, кофеин, менструация, заболевание глаз, другие заболевания могут быть источником частых или хронических головных болей.

Частое мочеиспускание:

Около 6-8 недель после зачатия, вы можете начать более часто посещать ванную комнату.

Другие причины: инфекции мочевыводящих путей, диабет, увеличение приема жидкости, или прием диуретиков.

Потемнение вокруг сосков:

Кожа вокруг сосков может потемнеть при беременности.

Другие причины: гормональный дисбаланс, эффект оставшихся от предыдущей беременности.

Увеличение аппетита:

Увеличивается желание поесть что-нибудь солененькое или сладкое. Многие женщины испытывает тягу к определенным видам продукта в течении всего срока беременности.

Другие причины: плохое питание, отсутствие некоторых питательных веществ, стресс, депрессия, или менструация.

Симптомы/признаки беременности

Автор: admin

10.09.2011 00:02 - Обновлено 04.11.2014 12:24

Больше информации **тут**