

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ

Автор: словарь
11.05.2009 18:10 -

Промежуточный мозг (лат. *diencephalon*) — часть мозгового ствола; формируется из оставшейся неразделенной задней части переднего мозга. Включает эпиталамус (надбуторье, *epithalamus*), метаталамус (забугорье, *metathalamus*), таламус (*thalamus*), гипоталамус (подбуторье, *hypothalamus*).

Металамус составляет два образования: латеральное коленчатое тело (*corpus geniculatum laterale*) и медиальное коленчатое тело (*corpus geniculatum mediale*). Латеральное коленчатое тело лежит под подушкой таламуса и имеет неправильную круглую форму. Строение его характеризуется слоистостью.

Латеральное коленчатое тело состоит из шести клеточных слоев: двух крупно- и четырех мелкоклеточных. Периферический зрительный путь заканчивается в мелких клетках, центральный берет начало от крупных клеток. Различные отделы сетчатки проецируются на разные части латерального коленчатого тела.

Медиальное коленчатое тело располагается между верхним холмиком четверохолмия и подушкой зрительного бугра. Ядро его состоит из мелко- и крупноклеточных частей.

Клетки имеют многоугольную форму. Афферентной системой медиального коленчатого тела являются волокна боковой петли, которые образуют вокруг него капсулу и заканчиваются в его клетках. От клеток медиального коленчатого тела начинается центральный слуховой путь, который направляется к коре височной области мозга. См. также Таламус и Гипоталамус.