

## Чем опасно самолечение во время беременности и после?

Когда я находилась в интересном положении, то с опаской относилась ко всем лекарствам, в том числе, и к тем, которые мне назначал мой доктор. Мне казалось, что беременность и медикаменты, это то же самое, что гений и злодейство. Но срок беременности увеличивался, и организм стал давать сбои. Сначала токсикоз, нехватка витаминов и минералов, потом скачки давления, анемия. Все это подтолкнуло меня обратиться к медикаментозному лечению.

Мой доктор прописывал необходимые препараты, которые стабилизировали мое состояние здоровья. Тогда я сделала **четкий вывод**: запомнить нужно только две вещи:  
**нельзя заниматься самолечением;**  
**принимать лекарства можно лишь после консультации с вашим лечащим врачом.**

Самое страшное, что прием, казалось бы, абсолютно безвредных лекарств, к которым мы обращаемся очень часто, может причинить вред плоду, а иногда и вызвать его гибель. Например, таблетка аспирина от головной боли, или анальгин при зубной боли.

Все мы знаем, что беременность женщины состоит из трех периодов формирования и развития плода. Самыми опасными считаются первый триместр (с момента зачатия до 12 недель), в это время у эмбриона формируются все органы и системы, и третий (от 22 недель до родов), когда происходит развитие и окончательное формирование плода.

Естественно, что протекание беременности будет сопряжено с постоянными колебаниями состояния здоровья, так как иммунитет беременной значительно снижен. В это время организм очень чувствителен к различным инфекциям и вирусам. Но не следует забывать о том, что существуют периоды, когда беременной вообще противопоказаны любые лекарственные препараты.

### **Сроки беременности и возможные негативные последствия приема лекарств:**

В конце уже **первой** недели беременности прием лекарственных препаратов не только нежелателен, но и крайне опасен (1-2 неделя). Последствия могут быть самые ужасные, вплоть до внутриутробной гибели зародыша.

На **третьей** неделе беременности начинается формирование всех органов жизнедеятельности плода, а также системы: кровеносная, пищеварительная, нервная, мочевыделительная, костная. Прием «опасных» лекарств в этот период (3-12 неделя) может вызвать тератогенный эффект, то есть возникновение пороков развития и уродства плода.

Начиная с **тринадцатой** недели вплоть до самых родов продолжается быстрый рост плода. В это время становятся физически ощутимы его периодические шевеления. Также у ребенка развиваются органы вкуса и обоняния. И этот период небезопасен, так как прием некоторых лекарств может вызвать нарушение функционирования отдельных органов и систем плода.

**Что же мы имели в виду, когда говорили об «опасных» лекарствах для беременных и кормящих женщин?**

*Во-первых*, лекарства, которые могут нанести вред плоду.

К ним относятся:

**Аспирин, Диклофенак** – принятие этих препаратов на любой стадии беременности может вызвать нарушение свертываемости крови у плода.

**Ибупрофен** – может вызвать патологическое увеличение периода беременности (перенашивание).

**Анальгин** – этот препарат может способствовать развитию у ребенка полидактилии, это феномен, когда у ребенка вырастает более пяти пальцев на руках и ногах. Также прием этого лекарства вызывает патологию в виде заращения анального отверстия у плода.

**Алмагель** – может способствовать формированию у плода пороков сердца.

**Левомецетин** – применение этого препарата может вызвать появление «синдрома серого ребенка», это не что иное, как сердечно-сосудистая недостаточность.

**Тетрациклин** – провоцирует пороки развития скелета и зубной ткани у ребенка, кариес и задержку роста.

**Раунатин** – грозит задержкой развития плода.

*Во-вторых*, препараты, которые нельзя принимать кормящим мамам, во избежание вредного воздействия на новорожденного.

К ним относятся:

**Индометацин** – повышение артериального давления у новорожденного.

**Кеталгин, Напроксен, Пироксикам, Фастум гель** – группа этих препаратов в ряде случаев вызывает у новорожденных лекарственную зависимость, что вызывает учащенное сердцебиение, повышение артериального давления и даже судороги.

**Анаприлин, Атенолол, Вазокардин** – эти препараты очень вредны для новорожденного, так как в ряде случаев вызывают замедление сердцебиения, а также снижение артериального давления.

**Гентамицин** – может вызвать нарушение слуха.

**Димедрол** – вызывает беспокойство, судороги.

К сожалению, этот список не ограничивается лишь вышеприведенными препаратами. Их гораздо больше, а последствия от их приема могут быть самыми тяжелыми. Поэтому, дорогие «мамочки», относитесь очень внимательно к своему здоровью и с осторожностью к препаратам, которые вы принимаете, тогда и малыш будет чувствовать себя хорошо.

Желаю вам здоровья и терпения!

## Чем опасно самолечение во время беременности и после

Автор: admin

20.04.2013 15:19 -

---

**Автор - Наталья Шимина**

[Источник](#)