Автор: admin
22.12.2007 23:54 -

Риск инсульта у женщин

Для мигрени с аурой характерен комплекс нейрологических симптомов, возникающих непосредственно перед приступом головной боли или в момент его начала. Аурой может быть помутнение зрения («туман» перед глазами), слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные или тактильные галлюцинации, головокружение, оцепенение, проблемы с концентрацией и речью.
Мигрени с аурой чаще развиваются у женщин моложе 45 лет, которые курят и принимают противозачаточные таблетки. На этот вид головной боли жалуются 10-20% населения Земли, но у женщин этот недуг встречается в четыре раза чаще, чем у мужчин.
Коллектив специалистов из США, Франции и Германии изучил результаты девяти последних исследований и пришел к выводу, что мигрень с аурой на 30% увеличивает риск стенокардии, хотя связи между заболеванием и сердечными приступами или смертельным исходом ученые не обнаружили.
Исследователи настоятельно рекомендуют женщинам, страдающим мигренями с аурой, отказаться от курения и приема противозачаточных таблеток, содержащих эстроген. Недавние эксперименты на животных показали, что эстроген вызывает появление ауры, то есть этот половой гормон может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.