

Гиперсексуальность — повышение полового влечения (гиперлибидемия) и половой активности. Физиологическая Г. наблюдается в юношеском возрасте, иногда — в начале инволюционного периода («седина в бороду — бес в ребро»), а в течение всей жизни — как проявление сверхсильной половой конституции. Появление Г. в зрелом возрасте бывает симптомом грозных заболеваний: гормонообразующей опухоли половых желез, надпочечников, гипофизарно-гипоталамического комплекса. Описана Г. при некоторых интоксикациях (туберкулезе, приеме одурманивающих средств). Наиболее гротескные формы приобретает Г. в рамках психических заболеваний (эпилепсии, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза) — сатириазис у мужчин и нимфомания у женщин. В отдельных случаях больные переезжают из города в город, ежедневно меняют десятки партнеров, организуют групповые оргии и полностью теряют контроль над своим поведением. Г. нельзя смешивать с сексуальной расторможенностью при олигофрении, старческом слабоумии, дефектных состояниях у психически больных, где нет реального усиления сексуальной энергии. Г. также отличается от «спортивного» секса с частой сменой партнеров: донжуанизма у мужчин и мессалинизма у женщин, т. к. при Г. чаще наблюдается промискуитет — беспорядочные половые сношения со случайными партнерами, включая гомосексуальные контакты и групповые формы. В последние годы разрабатывается теория сексуальной аддикции (сексаголизма) — неодолимого влечения к сексуальным действиям наподобие алкоголизма или страсти к азартным играм. Феномен аддикции лежит в основе криминальных форм активности (парафилии, сексуальное насилие, инцест) сексуальных маньяков с компульсивными поступками и полным пренебрежением к их последствиям.

С. Т. Агарков